

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：布洛芬片

英文名称：Ibuprofen Tablets

汉语拼音：Buluofen Pian

【成份】本品每片含布洛芬0.1克。辅料为：乳糖、羟丙纤维素、淀粉、聚山梨酯80、羧甲淀粉钠、二氧化硅、硬脂酸镁。

【性状】本品为薄膜衣片，除去包衣后显白色。

【作用类别】本品为解热镇痛类非处方药药品。

【适应症】用于缓解轻至中度疼痛如头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。

【规格】0.1克

【用法用量】口服。12岁以上儿童及成人一次2片，若持续疼痛或发热，可间隔4~6小时重复用药1次，24小时不超过4次。儿童用量见下表：

| 年龄(岁) | 体重(公斤) | 一次用量(片) | 次数 |
|-------|--------|---------|------------------------------------|
| 1~3 | 10~15 | 1/2 | 若持续疼痛或发热，可间隔4~6小时重复用药1次，24小时不超过4次。 |
| 4~6 | 16~21 | 1 | |
| 7~9 | 22~27 | 1.5 | |
| 10~12 | 28~32 | 2 | |

【不良反应】

- 少数病人可出现恶心、呕吐、胃烧灼感或轻度消化不良、胃肠道溃疡及出血、转氨酶升高、头痛、头晕、耳鸣、视力模糊、精神紧张、嗜睡、下肢水肿或体重骤增。
- 罕见皮疹、过敏性肾炎、膀胱炎、肾病综合征、肾乳头坏死或肾功能衰竭、支气管痉挛。

【禁忌】

- 对其他非甾体抗炎药过敏者禁用。
- 孕妇及哺乳期妇女禁用。
- 对阿司匹林过敏的哮喘患者禁用。

【注意事项】

- 本品为对症治疗药，不宜长期或大量使用，用于止痛不得超过5天，用于解热不得超过3天，如症状不缓解，请咨询医师或药师。
- 1岁以下儿童应在医师指导下使用。
- 不能同时服用其他含有解热镇痛药的药品（如某些复方抗感冒药）。
- 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。
- 有下列情况患者慎用：60岁以上、支气管哮喘、肝肾功能不全、凝血机制或血小板功能障碍（如血友病）。
- 下列情况患者应在医师指导下使用：有消化性溃疡史、胃肠道出血、心功能不全、高血压。
- 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。

8.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

9.本品性状发生改变时禁止使用。

10.请将本品放在儿童不能接触的地方。

11.儿童必须在成人监护下使用。

12.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

13.如出现胃肠道出血或溃疡、胸痛、气短、无力、言语含糊等情况，应停药并咨询医师。

14.第一次使用本品如出现皮疹或过敏症状，应停药并咨询医师。

【药物相互作用】

- 本品与其他解热、镇痛、抗炎药物同时可增加胃肠道不良反应，并可能导致溃疡。
- 本品与肝素、双香豆素等抗凝药同时用，可导致凝血酶原时间延长，增加出血倾向。
- 本品与地高辛、甲氨蝶呤、口服降血糖药物同时用，能使这些药物的血药浓度增高，不宜同用。
- 本品与呋塞米（呋喃苯胺酸）同时用，后者的排钠和降压作用减弱；与抗高血压药同时用，也降低后者的降压效果。
- 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品能抑制前列腺素的合成，具有解热镇痛及抗炎作用。

【贮藏】密封保存。

【包装】

塑料瓶包装，每瓶30片，每小盒1瓶；每瓶100片，每小盒1瓶。

聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔，每板12片，每小盒1板；每板12片，每小盒2板。

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2020年版二部

【批准文号】国药准字H44021567

【说明书修订日期】2022年12月26日

【药品上市许可持有人】

名称：广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂

注册地址：广州市白云区同和街云祥路88号

【生产企业】

企业名称：广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂

生产地址：广州市白云区同和街云祥路88号

邮政编码：510515

质量服务电话：(020) 87063679

销售服务电话：(020) 87573176

药物警戒电话：(020) 87062636

传真号码：(020) 87061075

网址：<http://www.byszc.com>

如有问题可与生产企业联系



广药白云山

广州白云山医药集团股份有限公司
白云山制药总厂